

## Chocola

Het is de tijd van het jaar weer dat er ongetwijfeld ergens een schaalpje met chocolade eitjes in je huis staat. Erg lekker voor ons mensen maar het kan levensgevaarlijk zijn voor onze honden. Let dus op dat je de eitjes, of andere chocolade, goed wegzet en dat de hond er niet bij kan op een onbewaakt ogenblik.



In chocolade zit het stofje theobromine, wat giftig is voor onze honden. Inname in grote hoeveelheden kan zelfs de dood van een hond tot gevolg hebben. Hoe puurder de chocola, hoe meer theobromine in de chocola. Theobromine werkt in op het centraal zenuwstelsel en op de hartspier. Gevaarlijk is een dosis tussen de 100-150 mg per kilo lichaamsgewicht.

- In pure chocolade zit  $\pm$  15 mg theobromine per gram
- Melkchocolade bevat 1,5 – 3,3 mg per gram
- Cacaopoeder 5 – 21 mg per gram

De gevaarlijke grens is dus voor kleine honden eerder bereikt, dan grote honden. Een rekenvoorbeeld: Een reep pure chocolade van 200 gram, kan dodelijk zijn voor een hond van 30 kilo. Bij oude en zieke honden zal deze eerder bereikt worden.

Wat zijn de symptomen en hoe te handelen?

Na het eten van chocola **kan** de hond na enkele uren het volgende gedrag vertonen:

Braken, diarree, buikpijn, hijgen en de hond kan onrustig en nerveus zijn. Ook erge dorst, trillen en toevallen kunnen een symptoom zijn. Meestal is dit in combinatie met een onregelmatig of versnelde hartslag. Er bestaat de mogelijkheid dat de hond door een acute hartstilstand plotseling overlijdt.

Wanneer je ontdekt dat de hond chocola gegeten heeft, bijvoorbeeld als je bij thuiskomst restanten van verpakkingen aantreft, twijfel dan niet en raadpleeg de dierenarts. Hoe eerder hoe beter!

De beste therapie is om de hond een braakmiddel toe te dienen om de maaginhoud te legen. Theobromine wordt pas door het lichaam opgenomen in de richting van de darmen. Dit proces duurt  $\pm$  3 uur.

Mocht het onverhoopt toch langer geduurd hebben, dan zal de dierenarts een infuus aanleggen bij de hond en actieve kool toedienen, in de hoop nog zoveel mogelijk van de giftige stof te binden voordat het opgenomen wordt. Soms moet een maag dan ook nog gespoeld worden. Dit gebeurt onder een roesje waarbij het noodzakelijk is dat de hond tijdelijk opgenomen moet worden. Indien de hond toevallen heeft, zullen kalmerende middelen gegeven worden. In veel gevallen wordt bij bovenstaande aanpak het leven van de hond gered.

Bovenstaand verhaal is bedoeld als informatie. Het is niet nodig om in paniek te raken als de hond een paar kruimels hagelslag vindt, of een enkel eitje op eet.

*Nb: het is de makers van dit document niet duidelijk wie de maker of eigenaar is van de gebruikte afbeelding(en).*

